

ETIQUETTE PATIENT

TRAITEMENT

HEPARINE INCRIMINEE

Héparine :

Indication :

Date de début :

Date d'arrêt :

TRAITEMENT ANTERIEUR PAR HEPARINE

OUI

Nom de l'héparine :

NON

Date du traitement :

RELAIS ACTUEL (Arganova, Orgaran, ...)

OUI

NON

Traitement de relais :

Date d'introduction :

APPARITION D'UNE THROMBOSE SOUS HEPARINE

OUI

NON

THROMBOPENIE : AUTRES CAUSES POSSIBLES

Infection, CIVD :

OUI

NON

Autres causes (chirurgie, chimiothérapie, ...)

OUI

NON

Autres médicaments responsables de thrombopénie

OUI

NON

Précisions :

Numération	Avant héparine	J0	J1	J2
Hb (g/dL)									
Plaquettes (G/L)									
Date									

SCORE CLINIQUE DES 4T DE PROBABILITE DE TIH

Score

THROMBO
PENIE

↘ plaquettes ≥ 50% **ET** nadir plaquettes ≥ 20 G/L

2

↘ plaquettes entre 30 et 50% **OU** nadir plaquettes entre 10 et 20 G/L

1

↘ plaquettes ≤ 30% **OU** nadir plaquettes ≤ 10 G/L

0

CINETIQUE

↘ plaquettes entre 5^{ème} et 10^{ème} jour **OU** en 24h si exposition à l'héparine récente (<30 j)

2

↘ plaquettes après 10 jours **OU** en 24h si exposition semi-récente à l'héparine (30-100j)

1

↘ plaquettes entre J1 et J4 sans exposition récente à l'héparine

0

THROMBOSE
LESIONS
CUTANEEES

Nouvelle thrombose **OU** nécrose cutanée **OU** réaction systémique après bolus d'héparine

2

Extension ou récurrence d'une thrombose **OU** suspicion de thrombose en cours d'exploration **OU** lésions érythémateuses cutanées

1

Aucun de ces évènements

0

CAUSES DE
THROMBO
PENIE

Aucune autre cause de thrombopénie

2

Autre(s) cause(s) possible(s)

1

Autre(s) cause(s) connue(s) : chirurgie, sepsis, ...

0

Probabilité clinique Score	Faible 0-3	Moyenne 4-5	Fort 6-8
-------------------------------	---------------	----------------	-------------