

TEST AU SYNACTHÈNE® RAPIDE OU IMMÉDIAT

But du test

Exploration de la cortico-surrénale par stimulation par l'ACTH de synthèse.

Produit

Tétracosactide (Synacthène®, ampoule à 0,25 mg dans 1 ml).

Dose

- Adulte : 0,25 mg (1 ampoule).
- Enfant : 0,25 mg/m² de surface corporelle (sans dépasser 0,25 mg).

Protocole

- Sujet à jeun depuis 12 h et au repos depuis 30 min.
- Prélèvement (tube sec ou tube EDTA) au temps 0 (8 h du matin) (T0).
- Injection IM de la dose appropriée de Synacthène®.
- Prélèvements (tube sec ou tube EDTA) en respectant la prescription du médecin ou aux temps T+30 et T+60 min après l'injection de Synacthène®.

Prélèvements

Après centrifugation des prélèvements, les sérums ou les plasmas sont conservés à +4°C.

Dosages

Cortisol et/ou : 17-hydroxyprogestérone, 21-désoxycortisol, 11-désoxycortisol, 17-hydroxyprégnénone, déhydroépiandrostérone, androstènedione, 11-désoxycorticostérone, aldostérone.

Contre-indications

- Asthme.
- Sujets allergiques.

Cotation

- Cortisol : 3 fois B65 (réf.0462)
- 11-hydroxyprogestérone : 3 fois B100 (réf. 1135)
- 21-désoxycortisol : 99.00 EUR (non remboursable)
- 11-désoxycortisol : 93.00 EUR (non remboursable)
- 11-désoxycorticostérone : 99.00 EUR (non remboursable)
- 11-hydroxyprégnénone : 102.00 EUR (non remboursable)

